சில பக்க விளைவுகள், உங்கள் உடல், தடுப்புசக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதன் அறிகுறிகள்



தடுப்பூசி போட்ட பிறகு, ஊசி குத்திய இடம் சிவப்பது அல்லது வீங்குவது, சோர்வு, காய்ச்சல் ஆகிய பக்க விளைவுகள் ஏற்படுவது வழக்கம். கொவிட்-19 கிருமிக்கு எதிராக உங்கள் உடல், தடுப்புசக்தியை வளர்த்துக் கொள்கிறது என்பதற்கான அறிகுறிகள் இவை. வழக்கமாக, இவை சில நாட்களில் சரியாகிவிடும்.

தடுப்பூசிகள் போட்டுக்கொள்வதால் கடுமையான ஒவ்வாமை ஏற்படுவது மிக அரிது. உங்களுக்கு ஒவ்வாமை இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால், (எ.கா. கண், உதடு வீக்கம், தோல் அரிப்பு, பொதுவான தோல் தடிப்பு, அல்லது மூச்சுத்திணறல்) உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடவும்.

முதல் தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொண்ட பிறகு ஒவ்வாமை ஏற்பட்டால், இரண்டாவது தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்ளக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

மேல் விவரங்களுக்கு, **vaccine.gov.sg** இணையத்தளத்தை நாடுங்கள் அல்லது **1800-333-9999** என்ற எண்ணை அழையுங்கள்

VACCINATION SG

gov.sg